



Sistema
Nervioso *Central*

V A D E M É C U M



CAPLIN POINT®
Laboratories

Las enfermedades degenerativas del SNC se caracterizan por la destrucción neuronal y/o la pérdida de funciones cognitivas y motoras. Debido al alto costo de los fármacos para su control, muchos pacientes no pueden costear su tratamiento.

Por ello, Caplin Point Laboratories se esfuerza diariamente por aumentar el acceso público a los medicamentos destinados a tratar dichas patologías, a nivel nacional e internacional, ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos.

Según su acción terapéutica, nuestras alternativas farmacológicas, en monoterapia y en combinación, se clasifican en:

ANTIEPILÉPTICOS

Inhibidores de los canales de sodio, inhibidores GABAérgicos, derivados de la pirrolidona y monosacárido sulfamato

NEUROMODULADORES

Inhibidores de la liberación de neurotransmisores excitadores

ANTIPSIÓTICOS

Bloqueadores de los receptores D2 y D4

ANTIVERTIGINOSOS

Agonistas/antagonistas de los receptores H1 y H3 de histamina

ISRS

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina

ANTICOLINÉRGICOS

Inhibidores de la acetilcolinesterasa

ANTIPARKINSONIANOS

Dopaminérgicos (L-Dopa + inhibidor de la descarboxilasa periférica)

ANESTÉSICOS

Anestésicos generales de acción corta

HORMONAS OCITÓCICAS

Estimulantes de la musculatura lisa del miometrio uterino

NOOTRÓPICOS

Potenciadores cognitivos

PARASIMPATICO-MIMÉTICOS

Agonistas colinérgicos

COMPLEJO B - NEUROTROPAS

Coadyuvantes en el tratamiento de neuralgias, neuropatías y anemia



Sistema Nervioso *Central*

Í N D I C E

ANTIÉPILÉPTICOS

- 04 Ácido Valproico
- 05 Lamotrigina
- 06 Levetiracetam
- 07 Topiramato

NEUROMODULADORES

- 08 Gabapentina
- 09 Pregabalina

ANTIPSICÓTICOS

- 10 Carbonato de litio
- 11 Quetiapina Fumarato
- 12 Risperidona
- 13 Olanzapina

ANTIVERTIGINOSOS

- 14 Betahistina

ISRS

- 15 Escitalopram
- 16 Sertralina Clorhidrato

ANTICOLINÉRGICOS

- 17 Rivastigmina

ANTIPARKINSONIANOS

- 18 Carbidopa + Levodopa

ANESTÉSICOS

- 19 Propofol

HORMONAS OCITÓICAS

- 20 Oxitocina


NOOTRÓPICOS

- 21 Citicolina
- 22 Piracetam

PARASIMPATICOMIMÉTICOS

- 23 Neostigmina

COMPLEJO B - NEUROTROPAS

- 24 Curoner®
 - 25 Neuroplin®
- 

Ácido Valproico

ANTIEPILEPTICOS



INDICACIÓN

- > Para el tratamiento de epilepsias generalizadas o parciales:
- > Generales primarias: Convulsivas, no convulsivas, mioclónicas.
- > Parciales: Con sintomatología elemental (comprendidas las formas Bravais-Jacksonianas) o sintomatología compleja (formas psico-sensoriales, psicomotrices).



PRESENTACIONES

250 mg / 5 mL

Frasco de 120 mL



Sistema
Nervioso Central

Lamotrigina

ANTIEPILÉPTICOS

INDICACIÓN

- > Para el tratamiento combinado o en monoterapia de crisis epilépticas parciales y generalizadas, incluyendo convulsiones tónico-clónicas.
- > Síndrome de Lennox-Gastaut.
- > Tratamiento de crisis de ausencias típicas.
- > Desorden bipolar.
- > Prevención de episodios depresivos bipolares.



PRESENTACIONES

25 mg

Caja de 30 tabletas

100 mg

Caja de 30 tabletas

 **Sistema Nervioso Central**

Levetiracetam

ANTIÉPILÉPTICOS



INDICACIÓN

- > Para el tratamiento de las crisis epilépticas de inicio parcial con o sin generalización secundaria y crisis epilépticas mioclónicas, incluyendo convulsiones tónico-clónicas.



PRESENTACIONES

500 mg

Caja de 10 tabletas recubiertas

Topiramato

ANTIÉPILÉPTICOS



INDICACIÓN

- > Para el tratamiento combinado o en monoterapia de crisis epilépticas parciales y generalizadas, incluyendo convulsiones tónico-clónicas.
- > Síndrome de Lennox-Gastaut.
- > Profilaxis de la migraña, después de una evaluación cuidadosa de posibles opciones de tratamiento alternativas.



PRESENTACIONES

100 mg

Caja de 100 tabletas recubiertas



Gabapentina

NEUROMODULADORES



INDICACIÓN

- > Terapia adyuvante en el tratamiento de crisis epilépticas parciales, con o sin generalización secundaria.
- > Tratamiento del dolor neuropático periférico.



PRESENTACIONES

400 mg

Caja de 100 cápsulas

Pregabalina

NEUROMODULADORES

INDICACIÓN

- > Dolor neuropático.
- > Neuropatía periférica y central.
- > Fibromialgia.
- > Trastorno de la ansiedad generalizada.
- > Coadyuvante en casos de epilepsia parcial, con o sin generalización secundaria.



PRESENTACIONES

75 mg

Caja de 10 tabletas

150 mg

Caja de 10 tabletas



Carbonato de Litio

ANTIPSIKÓTICOS



INDICACIÓN

- > Profilaxis y tratamiento de trastornos bipolares.
- > Depresión mayor recurrente.



PRESENTACIONES

300 mg

Caja de 100 tabletas

Quetiapina

FUMARATO

ANTIPSIKÓTICOS

INDICACIÓN

- > Esquizofrenia.
- > Trastorno bipolar.



PRESENTACIONES

300 mg

Caja de 30 comprimidos recubiertos

 **Sistema Nervioso Central**

Risperidona

ANTIPSIKÓTICOS



INDICACIÓN

- > Tratamiento sintomático de la psicosis esquizofrénica aguda y crónica.
- > Alteraciones del comportamiento en pacientes con demencia de tipo Alzheimer.
- > Trastornos de la conducta.



PRESENTACIONES

1 mg

Caja de 30 tabletas

2 mg

Caja de 30 tabletas



Olanzapina

ANTIPSICÓTICOS



INDICACIÓN

- > Esquizofrenia.
- > Tratamiento del episodio maniaco, de moderado a grave.
- > Prevención de las recaídas en pacientes que presentan trastorno bipolar que hayan respondido al tratamiento con olanzapina durante el episodio maniaco.



PRESENTACIONES

10 mg

Caja de 10 tabletas dispersables



Betahistina

ANTIVERTIGINOSOS



INDICACIÓN

- > Síndrome de Menière, definido por la tríada de síntomas: vértigo (con náuseas y vómitos), pérdida de la audición, y acúfenos.



PRESENTACIONES

8 mg

Caja de 100 tabletas

Escitalopram

ISRS



INDICACIÓN

- > Tratamiento de episodios depresivos mayores.
- > Trastornos de pánico.



PRESENTACIONES

10 mg

Caja de 100 tabletas recubiertas

20 mg

Caja de 10 tabletas recubiertas



Sertralina

CLORHIDRATO

ISRS

INDICACIÓN

- > Tratamiento de síntomas mayores en la depresión, como episodios inesperados de estados depresivos.
- > Trastorno obsesivo compulsivo.



PRESENTACIONES

50 mg

Caja de 30 tabletas recubiertas

Rivastigmina

ANTICOLINÉRGICOS



INDICACIÓN

- > Tratamiento sintomático de la demencia asociada a la enfermedad de Alzheimer.
- > Tratamiento sintomático de la demencia leve a moderadamente grave en pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática.



PRESENTACIONES

1.5 mg

Caja de 10 cápsulas

4.5 mg

Caja de 10 cápsulas

2 mg / ml

Solución oral de 120 ml



**Sistema
Nervioso Central**


Carbidopa/Levodopa

ANTIPARKINSONIANOS



INDICACIÓN

- > Tratamiento de la enfermedad de Parkinson.
- > Parkinsonismo postencefalítico.
- > Parkinsonismo sintomático que puede seguir a la intoxicación por monóxido de carbono o por manganeso.



PRESENTACIONES

25 mg / 250 mg

Caja de 30 tabletas

Propofol

ANESTÉSICOS

INDICACIÓN

- > Anestésico general intravenoso de corta acción para inducción y mantenimiento de la anestesia general o sedación de pacientes con respiración artificial en la unidad de cuidados intensivos.



PRESENTACIONES

10 mg / mL

Caja con 1 vial de 50 mL

 **Sistema Nervioso Central**

Oxitocina

HORMONAS OCITÓCICAS



INDICACIÓN

- > Inducción del parto por razones médicas, como en gestación prolongada, ruptura prematura de membranas y preclamsia.
- > Estimulación de las contracciones en casos de inercia uterina.
- > Prevención y tratamiento de atonía uterina y hemorragia posparto.



PRESENTACIONES

5 UI / mL

Caja de 100 ampollas de 1 mL

Citicolina

NOOTRÓPICOS



INDICACIÓN

- > Accidentes cerebrovasculares.
- > Traumatismo craneal.
- > Tratamiento del deterioro cognitivo senil.
- > Terapia coadyuvante en enfermedad de Parkinson.



PRESENTACIONES

250 mg/mL

Caja de 10 ampollas de 4 mL

500 mg

Caja de 30 tabletas recubiertas



Piracetam

NOOTRÓPICOS

INDICACIÓN

- > Para el tratamiento sintomático de los estados de deterioro mental debido a una patología cerebral degenerativa, trastornos de la atención y de la memoria, dificultades en la actividad cotidiana y mioclonías corticales.



PRESENTACIONES

800 mg

Caja de 10 tabletas recubiertas



Neostigmina

METILSULFATO

PARASIMPATICOMIMÉTICOS



INDICACIÓN

- > Esquizofrenia.
- > Trastorno bipolar.



PRESENTACIONES

0.5 mg / mL

Caja de 10 ampollas de 1 mL



**Sistema
Nervioso Central**

Curoner®

MECOBALAMINA

COMPLEJO B - NEUROTROPAS



INDICACIÓN

- > Tratamiento de neuropatías periféricas y anemia megaloblástica causada por la deficiencia de vitamina B12.



PRESENTACIONES

500 mcg / mL

Caja de una jeringa prellenada de 1 mL

Neuroplin®

NEUROTROPAS

COMPLEJO B - NEUROTROPAS



INDICACIÓN

- > Tratamiento de neuritis, neuralgias y neuropatías, como neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, isquialgia, síndrome lumbar, síndrome cervical, síndrome del hombro doloroso, neuritis radicular producto de enfermedades degenerativas de la columna vertebral, parálisis facial.
- > Para la prevención y tratamiento de deficiencia de vitamina B1, B6 y/o B12. La deficiencia puede estar asociada a múltiples manifestaciones neurológicas como parestesias y disestesias, alteraciones en la sensibilidad, alodinia y otros.



PRESENTACIONES

25,000 mcg

Caja de una jeringa prellenada de 3 mL




Prellenadas CAPLIN




Fórmula Preparada

Una dosis exacta,
sin riesgo de contaminación
o pérdida de contenido



Marcas
de calidad mundial
al alcance de **TODOS**



3 IM/IV/SC




Fácil
de **administrar**

- 1 Desenrosca la tapa de seguridad
- 2 Coloca la aguja y retira el capuchón
- 3 Inyecta por vía intramuscular, intravenosa o subcutánea según indique el medicamento



 **Línea**
Analgésica

V A D E M É C U M



Hay dos tipos de dolor: dolor agudo, debido a una enfermedad, lesión o inflamación que puede ser tratado; y dolor crónico, un problema de salud pública que afecta a aproximadamente el 29% de la población mundial.

Caplin Point Laboratories se esfuerza cada día por aumentar el acceso público a los fármacos que tratan estos tipos de dolor, a nivel nacional e internacional, ayudando a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes.

Según su acción terapéutica, nuestras alternativas farmacológicas, en monoterapia y en combinación, se clasifican en:

AINE

Antiinflamatorios no esteroideos inhibidores de la COX-1 y COX-2

INHIBIDOR SELECTIVO DE LA COX-2

AGONISTA OPIOIDE

Analgésico de acción central, inhibidor de la recaptación de norepinefrina y la intensificación de la liberación de serotonina, en monoterapia o en combinación con un analgésico puro

ÍNDICE

AINE

- 29 Dropa Dex®
- 30 Dropa Dex® Duo
- 31 Etoricoxib

AGONISTA OPIOIDE

- 32 Zignet®

AGONISTA OPIOIDE + ANALGÉSICO

- 33 Zignet® Plus

Dropa Dex[®]

DEXKETOPROFENO

AINE

INDICACIÓN

- > Tratamiento sintomático del dolor leve o moderado.
- > Dolor musculoesquelético.
- > Dolor de articulaciones.
- > Dismenorrea.
- > Dolor dental.



PRESENTACIONES

25 mg / mL

Caja de 1 jeringa prellenada de 2 mL

25 mg

Caja de 50 cápsulas de gelatina blanda

 **Línea
Analgésica**

Dropa Dex[®] Duo

DEXKETOPROFENO + NEUROTROPAS

AINE

INDICACIÓN

- > Tratamiento sintomático del dolor leve o moderado.
- > Dolor musculoesquelético.
- > Dolor de articulaciones.
- > Dismenorrea.
- > Dolor dental.



PRESENTACIONES

25 mg / 50 mg / 50 mg / 1,000 mcg

Caja de 50 cápsulas

30

Etoricoxib

INHIBIDOR SELECTIVO COX-2

INDICACIÓN

- > Alivio sintomático de osteoartritis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante.
- > Dolor y signos de inflamación asociados con la artritis gotosa aguda.
- > Tratamiento a corto plazo del dolor moderado asociado con la cirugía dental.



PRESENTACIONES

60 mg

Caja de 10 tabletas

90 mg

Caja de 10 tabletas

 **Línea
Analgésica**

Zignet®

TRAMADOL CLORHIDRATO

AGONISTA OPIOIDE

INDICACIÓN

- > Para el tratamiento y la prevención del dolor moderado a severo, tanto agudo como crónico, así como en procedimientos dolorosos terapéuticos o de diagnóstico.



PRESENTACIONES

100 mg / 2 mL

Caja de 1 jeringa prellenada de 2 mL

Zignet® Plus

TRAMADOL + ACETAMINOFÉN

AGONISTA OPIOIDE + ANALGÉSICO

INDICACIÓN

- > Para el tratamiento sintomático del dolor moderado a intenso.
- > Su uso debe estar limitado a aquellos pacientes cuyo dolor requiera la combinación de tramadol y paracetamol.



PRESENTACIONES

325 mg + 37.5 mg

Caja de 10 tabletas recubiertas

 **Línea
Analgésica**



 Línea
Analgésica



Recomienda

NUESTROS *genéricos*

DE CALIDAD



invimó
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos



Cumplimos con estándares de Buenas Prácticas Manufactureras y contamos con certificaciones de calidad y seguridad sanitaria internacionales



VADEMECUM



10a. calle 27-67 zona 4 de Mixco, Colonia El Naranjo, Bodega 4,
Guatemala, Centroamérica



Caplin Point Laboratories
Neoethicals



@caplinpointlatam
@neoethicallsgt



@caplinpoint
@neoethicallsgt

www.neoethicals.com – caplinrx@neoethicals.com